

# Vytvořující funkce

19. května 2021

$\mathbb{R}[[x]]$ : Formální mocninné řady s proměnnou  $x$ :

$$(a_0, a_1, a_2, \dots) \approx a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots = \sum_{n \geq 0} a_n x^n.$$

Pro  $(\mathcal{A}, |\cdot|)$ , kde

- $|A| \in \mathbb{Z}_0^+$  pro každé  $\alpha \in \mathcal{A}$  a
- pro každé  $n \geq 0$  je  $\{\alpha \in \mathcal{A} : |A| = n\}$  konečná,

**vytvěřující funkce**  $A(x)$  systému  $(\mathcal{A}, |\cdot|)$  je FMŘ  $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$  tž.

$$a_n = |\{\alpha \in \mathcal{A} : |\alpha| = n\}|.$$

Příklad:  $\mathcal{A}$  = konečné řetězce z písmen a a b,  $|s|$  = délka řetězce  $s$ ,  $|\{s \in \mathcal{A} : |s| = n\}| = 2^n$ , vytvěřující funkce

$$A(x) = \sum_{n \geq 0} 2^n x^n = \frac{1}{1 - 2x}.$$

Pro systém  $\mathcal{B}$  objektů  $\beta$  na “množině vrcholů”  $V(\beta)$ , kde  $\mathcal{B}$  je uzavřená na přeznačení vrcholů, **exponenciální vytvořující funkce**  $B(x)$  je FMR  $\sum_{n \geq 0} b_n \frac{x^n}{n!}$  tž.

$$b_n = |\{\beta \in \mathcal{B} : V(\beta) = \{1, \dots, n\}\}|.$$

Příklad:  $\mathcal{B}$  = orientované cykly  $\beta$  na množině vrcholů  $V(\beta)$ ,  $|\{\beta \in \mathcal{B} : V(\beta) = \{1, \dots, n\}\}| = (n-1)!$ , exponenciální vytvořující funkce

$$B(x) = \sum_{n \geq 1} (n-1)! \frac{x^n}{n!} = \sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n} = -\log(1-x).$$

## Obyčejné vytvořující funkce:

Operace	koeficient u $x^n$	Význam
Součet $A(x) + B(x)$	$a_n + b_n$	(disjunktí) sjednocení
Součin $A(x)B(x)$	$\sum_{i=0}^n a_i b_{n-i}$	kartézský součin
$\frac{1}{1-A(x)}$	$\sum_{k \geq 0} [x^n] A^k(x)$	konečné posloupnosti

## Exponenciální vytvořující funkce:

Operace	koeficient u $x^n/n!$	Význam
Součet $A(x) + B(x)$	$a_n + b_n$	(disjunktí) sjednocení
Součin $A(x)B(x)$	$\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a_i b_{n-i}$	proložená dvojice
$e^{A(x)}$	$\sum_{k \geq 0} \frac{1}{k!} [x^n] A^k(x)$	vytvoření z komponent

## Příklad:

- $s_n$  = počet zakořeněných stromů s množinou vrcholů  $\{1, \dots, n\}$ ,  $S(x) = \sum_{n \geq 1} s_n \frac{x^n}{n!}$ .
- $l_n$  = počet zakořeněných lesů s množinou vrcholů  $\{1, \dots, n\}$ ,  $L(x) = \sum_{n \geq 0} l_n \frac{x^n}{n!}$ .
- $L(x) = e^{S(x)}$
- zakořeněný strom  $\sigma$  s množinou vrcholů  $V(\sigma) \approx$  kořen  $k \in V(\sigma)$  a zakořeněný les s množinou vrcholů  $V(\sigma) \setminus \{k\}$ .
- $S(x) = xL(x) = xe^{S(x)}$ .
- $\frac{S(x)}{e^{S(x)}} = x$ :  $S(x)$  je inverzní funkce k funkci  $f(y) = \frac{y}{e^y}$ .

Nechť  $\mathcal{A}$  je množina řetězců z písmen  $a$ ,  $b$  a  $c$  takových, že počet výskytů písmene  $a$  je sudý a písmeno  $b$  se vyskytuje nejvýše 4-krát, a  $a_n$  počet takových řetězců délky  $n$ . Najděte explicitní výraz pro exponenciální vytvořující funkci  $A(x) = \sum_{n \geq 0} a_n \frac{x^n}{n!}$ . Poznámka:

$$\frac{e^x + e^{-x}}{2} = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$$

Nechť  $C(x)$  je exponenciální vytvořující funkce pro orientované cykly délky alespoň 2, a  $P(x)$  je exponenciální vytvořující funkce pro permutace bez pevného bodu (tj. bijektivní funkce  $\pi : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$  takové, že  $\pi(i) \neq i$  pro  $i = 1, \dots, n$ ). Ukažte, že

$$P(x) = e^{C(x)} = \frac{e^{-x}}{1-x},$$

a vyvodte z toho, že počet permutací množiny  $\{1, \dots, n\}$  bez pevného bodu je  $n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}$ .

Nechť  $c_n$  je počet způsobů, jak rozdělit množinu  $\{1, \dots, n\}$  na neprázdné disjunktní části (na pořadí částí nezáleží), a  $C(x) = \sum_{n \geq 0} c_n \frac{x^n}{n!}$ . Ukažte, že  $C(x) = e^{e^x - 1}$ .



Nechť  $A(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$ , kde  $a_0, a_1, \dots \geq 0$ . Nechť tato řada konverguje pro nějaké  $x = R > 0$ . Ukažte, že pro dostatečně velké  $n$  platí  $a_n < (1/R)^n$ . S pomocí tohoto pozorování ukažte, že pro dostatečně velké  $n$  je počet (zakořeněných) stromů na  $n$  vrcholech nejvýše  $e^n n!$ .